

【定期予防接種（20歳未満）】

方法	場所	予防接種名 (予防疾病名)	対象年齢	回数		”望ましい接種期間”	注意すること
個別接種	市内指定医療機関 (※①)	B型肝炎 (B型肝炎)	生後2か月から 1歳になる前まで	3回		1回目…生後2か月 2回目…生後3か月 3回目…生後7か月	27日以上の間隔を おいて2回目接種し 1回目から139日 以上の間隔を おいて3回目接種
		五種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風・ポリオ Hib感染症)	生後2か月から 7歳6か月になる 前まで	1期 初回	3回	生後2か月～11か月	20日以上の間隔 (標準的には20～56日の間を おいて3回接種
				1期 追加	1回	3回目終了後、1年～ 1年半までの間隔を おく	6か月以上の間隔を おいて1回接種
		四種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ)	生後2か月から 7歳6か月になる 前まで	1期 初回	3回	生後2か月～11か月	20日以上の間隔 (標準的には20～56日の間を おいて3回接種
				1期 追加	1回	3回目終了後、1年～ 1年半までの間隔を おく	6か月以上の間隔を おいて1回接種
		二種混合 (ジフテリア 破傷風)	11歳以上13歳未 満	2期	1回	小学6年生	1期の接種歴が必 要になります。 該当年度に個別通 知
		肺炎球菌 (細菌性髄膜炎等)	生後2か月から 5歳になる前まで	初回	3回	生後2か月～11か月	27日以上の間隔を おいて3回接種
				追加	1回	生後12～15か月	60日以上の間隔を 置いて、生後12か 月以降1回接種
		ヒブ (ヒブ髄膜炎)	生後2か月から 5歳になる前まで	初回	3回	生後2か月～11か月	27日以上の間隔 (標準的には27～56日)を おいて3回(生後12 カ月までに)接種
				追加	1回	3回目終了後、7～13 月までの間隔をおく	7か月以上の間隔を おいて1回接種
		日本脳炎 (日本脳炎) 特例措置あり (※②)	生後6か月から 7歳6か月になる 前まで	1期 初回	2回	3歳～4歳	6日以上(標準的 には6～28日)の 間隔 (3歳の誕生月に 案内郵送)
				1期 追加	1回	4歳～5歳	6か月以上(標準 的には概ね1年)の 間隔を おいて1回接種
				2期	1回	9歳～10歳	該当年度に個別通 知
		ヒトパピローマ ウイルス感染症	12歳となる日の年 度の初日から16歳 となる日の年度の 末日まで	2価：3回	2価：13歳となる日 の年度の初日から 当該年度の末日ま での間		有効性と安全性を 理解したうえで 受けましょう(※④)
4価：3回	4価：13歳となる日 の年度の初日から 当該年度の末日ま での間						
ロタウイルス 感染症	1価：出生6週0日 から出生24週0日 まで	1価：2回	初回接種 生後2か月～出生 14週6日まで		ロタウイルス感 染症には2種類の ワクチンがあり ます。どちらの ワクチンを接種 しても同様の効果 がありますが1回 目に接種した ワクチンと同じ もので規定の回 数を摂取する 必要があります。		
	5価：出生6週0日 から出生32週0日 まで	5価：3回					
麻疹風しん (はしか 風しん)	1歳児から2歳に なる前まで	1期	1回	生後12～15か月	満1歳になったら できるだけ早く 接種しましょう。		
	小学校就学前の1 年間	2期	1回	幼稚園・保育所 年長児になっ たらできるだけ 早く	対象時期に個別 案内を郵送		
水痘 (水ぼうそう)	1歳児から3歳に なる前まで	初回	1回	生後12～15か月	満1歳になったら できるだけ早く 接種		
		追加	1回	初回終了後、6～12 か月までの間隔 をおく	3か月以上の 間隔を おいて接種		
集団接種	保健セン ター	BCG (結核)	生後3か月から1 歳になる前まで	1回 *スタンプ方式 で接種	生後5か月～7 か月	※実施日程(※③) 対象の方には 案内を郵送 します。	※他の生ワクチン (ロタ以外)予 防接種を 受けるときは 接種後4週間 以上あける

以下の詳細についてはこの表(PDF)を閉じ、リンク先をご覧ください。

※①市内指定医療機関 ※②日本脳炎 ※③BCG実施日程 ※④ヒトパピローマウイルス感染症