

知ってほしい受動喫煙の害

～吸わない人をも襲うたばこの害～



主流煙
(能動喫煙)

喫煙者が
直接吸い込む煙

副流煙 (受動喫煙)

たばこの先から出る煙
「主流煙」よりも
有害物質の含有量
はるかに多い

ニコチン

2.8倍

一酸化炭素

4.7倍

タール

3.4倍


喫煙は大切な**家族**の健康を害しています

喫煙は周囲の人を不快にするだけではありません
受動喫煙は肺がんやその他のがん、心臓病のリスクを高めます



夫の喫煙と妻の肺がんの死亡率


(妻は非喫煙者)



夫の一日の
喫煙状況

(平山 雄, 1990)

受動喫煙による乳幼児の病気の発症率



親が喫煙者の場合、
その**子ども**が
気管支喘息や**中耳炎**に
かかる割合が高くなります。

かぜをひきやすくなったり
気管支炎や**肺炎**を
起こしやすくなります。

小児がんの原因となる
可能性があります。

妊娠中・乳児の近くでの喫煙は、
出生体重低下や**早産**、
乳幼児突然死症候群(SIDS)
の危険が増します。

パパ、ママ吸わないで!



換気扇の下や**玄関先**・**ベランダ**の喫煙でも、
有害物質の吸入は防げません!